

(資料2)

都府県別松くい虫被害量(被害材積)の推移

(単位:千m3)

年度 区分	54	17	18	19	20	21	対前年度比 (%)
北海道	—	—	—	—	—	—	—
青森県	—	—	—	—	—	0.0	—
岩手県	0.5	40.1	39.8	38.5	44.9	41.6	93%
宮城県	1.8	18.8	19.5	17.4	14.4	15.0	104%
秋田県	—	27.5	26.3	22.4	19.1	14.4	76%
山形県	0.0	27.4	25.7	20.6	18.8	17.1	91%
福島県	2.8	59.4	57.6	49.5	44.1	40.6	92%
茨城県	712.5	4.4	4.5	4.7	4.0	3.6	91%
栃木県	46.9	13.8	12.8	10.1	11.5	11.3	98%
群馬県	0.4	15.0	15.4	13.9	12.2	10.9	90%
埼玉県	1.2	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	67%
千葉県	19.0	5.1	4.2	5.1	7.9	12.0	153%
東京都	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	93%
神奈川県	7.3	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	77%
新潟県	4.9	8.7	9.0	8.0	7.1	7.2	101%
富山県	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	113%
石川県	17.7	8.0	7.2	6.8	5.5	2.9	52%
福井県	5.2	13.7	13.5	10.4	11.9	9.5	80%
山梨県	0.6	15.2	11.5	11.1	11.0	10.5	95%
長野県	—	55.4	50.6	50.4	63.6	60.0	94%
岐阜県	13.4	9.2	6.4	3.3	3.1	2.8	90%
静岡県	75.2	16.6	19.4	18.7	12.0	8.0	66%
愛知県	84.1	7.1	9.5	8.2	7.6	6.4	84%
三重県	32.0	7.7	6.1	5.5	5.3	3.4	64%
滋賀県	6.8	4.9	4.4	3.2	2.9	2.2	76%
京都府	45.2	23.2	26.1	29.6	22.0	18.6	85%
大阪府	39.0	3.4	3.2	2.8	2.5	2.4	96%
兵庫県	120.7	8.5	8.1	10.1	9.9	9.6	97%
奈良県	53.3	2.5	2.3	1.9	1.8	1.5	86%
和歌山県	48.7	1.5	1.5	1.7	2.4	0.7	28%
鳥取県	120.7	13.9	17.2	19.5	20.1	13.3	66%
島根県	37.1	36.5	26.8	23.9	21.2	20.1	95%
岡山県	157.9	21.2	21.1	23.4	23.6	17.1	72%
広島県	85.8	25.9	25.5	29.1	28.7	23.4	82%
山口県	68.9	36.0	32.3	28.7	25.3	22.9	90%
徳島県	22.3	1.7	1.1	1.0	0.7	0.7	99%
香川県	111.4	14.0	13.7	15.5	16.1	16.7	103%
愛媛県	83.1	7.8	6.4	6.2	6.7	6.8	101%
高知県	9.7	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	110%
福岡県	67.2	2.2	1.4	3.3	2.5	2.7	108%
佐賀県	3.9	0.3	0.5	0.7	0.5	0.4	81%
長崎県	18.7	5.3	6.9	7.5	7.0	2.4	34%
熊本県	15.4	1.5	0.9	0.9	7.7	6.3	82%
大分県	52.3	1.3	1.1	1.5	0.7	0.6	82%
宮崎県	23.0	3.9	3.8	3.5	3.3	3.2	96%
鹿児島県	66.0	32.0	30.3	36.4	58.6	90.7	155%
沖縄県	0.5	40.9	29.7	22.8	21.4	15.9	74%
民有林	2,284.3	643.7	605.2	579.4	591.1	556.6	94%
国有林	148.5	45.5	38.7	39.8	35.1	37.2	106%
合計	2,432.8	689.2	643.9	619.2	626.1	593.8	95%
備考	松くい虫被害のピーク						

- 1 民有林については、都道府県からの報告による。
- 2 国有林(官行造林地を含む。)については、森林管理局からの報告による。
- 3 都道府県ごとに単位以下第二位を四捨五入した。
- 4 四捨五入により合計と一致しない場合がある。