

## 都府県別松くい虫被害量(被害材積)の推移

(単位:千m3)

年度 区分	54	18	19	20	21	22	対前年度比 (%)
北海道	—	—	—	—	—	—	—
青森県	—	—	—	—	0.0	—	—
岩手県	0.5	39.8	38.5	44.9	41.6	43.8	105%
宮城県	1.8	19.5	17.4	14.4	15.0	15.2	102%
秋田県	—	26.3	22.4	19.1	14.4	14.2	98%
山形県	0.0	25.7	20.6	18.8	17.1	15.2	89%
福島県	2.8	57.6	49.5	44.1	40.6	37.2	92%
茨城県	712.5	4.5	4.7	4.0	3.6	3.6	99%
栃木県	46.9	12.8	10.1	11.5	11.3	10.6	94%
群馬県	0.4	15.4	13.9	12.2	10.9	11.4	104%
埼玉県	1.2	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	100%
千葉県	19.0	4.2	5.1	7.9	12.0	8.8	73%
東京都	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	85%
神奈川県	7.3	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	108%
新潟県	4.9	9.0	8.0	7.1	7.2	6.0	84%
富山県	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	103%
石川県	17.7	7.2	6.8	5.5	2.9	2.3	82%
福井県	5.2	13.5	10.4	11.9	9.5	8.5	89%
山梨県	0.6	11.5	11.1	11.0	10.5	8.9	85%
長野県	—	50.6	50.4	63.6	60.0	60.5	101%
岐阜県	13.4	6.4	3.3	3.1	2.8	2.7	96%
静岡県	75.2	19.4	18.7	12.0	8.0	8.3	105%
愛知県	84.1	9.5	8.2	7.6	6.4	6.2	98%
三重県	32.0	6.1	5.5	5.3	3.4	3.1	92%
滋賀県	6.8	4.4	3.2	2.9	2.2	1.7	76%
京都府	45.2	26.1	29.6	22.0	18.6	19.5	104%
大阪府	39.0	3.2	2.8	2.5	2.4	2.2	92%
兵庫県	120.7	8.1	10.1	9.9	9.6	9.7	101%
奈良県	53.3	2.3	1.9	1.8	1.5	1.5	97%
和歌山県	48.7	1.5	1.7	2.4	0.7	0.5	80%
鳥取県	120.7	17.2	19.5	20.1	13.3	16.1	121%
島根県	37.1	26.8	23.9	21.2	20.1	26.0	129%
岡山県	157.9	21.1	23.4	23.6	17.1	16.4	96%
広島県	85.8	25.5	29.1	28.7	23.4	22.1	94%
山口県	68.9	32.3	28.7	25.3	22.9	22.2	97%
徳島県	22.3	1.1	1.0	0.7	0.7	0.8	115%
香川県	111.4	13.7	15.5	16.1	16.7	19.4	116%
愛媛県	83.1	6.4	6.2	6.7	6.8	6.3	94%
高知県	9.7	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	69%
福岡県	67.2	1.4	3.3	2.5	2.7	3.5	127%
佐賀県	3.9	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	130%
長崎県	18.7	6.9	7.5	7.0	2.4	1.8	75%
熊本県	15.4	0.9	0.9	7.7	6.3	2.4	37%
大分県	52.3	1.1	1.5	0.7	0.6	0.6	93%
宮崎県	23.0	3.8	3.5	3.3	3.2	3.3	102%
鹿児島県	66.0	30.3	36.4	58.6	90.7	92.9	102%
沖縄県	0.5	29.7	22.8	21.4	15.9	14.3	90%
民有林	2,284.3	605.2	579.4	591.1	556.6	551.4	99%
国有林	148.5	38.7	39.8	35.1	37.2	30.2	81%
合計	2,432.8	643.9	619.2	626.1	593.8	581.6	98%
備考	松くい虫被害のピーク						

- 1 民有林については、都道府県からの報告による。
- 2 国有林(官行造林地を含む。)については、森林管理局からの報告による。
- 3 都道府県ごとに単位以下第二位を四捨五入した。
- 4 四捨五入により合計と一致しない場合がある。