

### 国有林における都道府県別ナラ枯れ被害量（被害材積）の推移

(単位：千 $m^3$ )

区分	年度	H21	H22	H23	H24	H25	対前年度比
北海道		—	—	—	—	—	—
東北		18.0	12.7	11.9	4.1	3.4	83%
岩手県		—	0.0	0.0	0.0	0.0	19%
宮城県		0.0	0.5	0.5	0.2	1.1	580%
秋田県		0.1	0.4	0.6	0.5	0.5	110%
山形県		17.9	11.8	10.8	3.4	1.7	50%
関東		0.3	5.9	8.9	1.0	0.6	64%
福島県		0.1	0.0	0.6	0.5	0.2	32%
群馬県		—	0.0	0.0	0.0	0.0	145%
東京都		—	0.0	—	—	—	—
新潟県		0.2	5.8	8.2	0.2	0.0	9%
静岡県		—	—	0.0	0.2	0.4	207%
中部		0.0	0.4	2.7	0.8	0.6	71%
富山県		—	0.1	0.1	0.1	0.0	18%
長野県		—	0.3	0.2	0.1	0.1	121%
岐阜県		0.0	—	1.9	0.3	0.0	5%
愛知県		—	0.1	0.5	0.4	0.5	124%
近畿中国		1.5	3.3	3.7	1.4	1.3	92%
石川県		—	—	0.0	0.0	—	皆減
福井県		—	—	0.2	0.0	0.0	1%
三重県		—	—	0.0	0.0	0.0	96%
滋賀県		0.0	0.0	0.5	0.2	0.3	135%
京都府		0.2	1.1	0.5	0.1	0.2	119%
大阪府		—	—	0.1	0.0	0.1	108%
兵庫県		0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	546%
奈良県		—	—	—	—	0.1	皆増
和歌山県		—	—	0.0	0.0	—	皆減
鳥取県		0.3	0.3	0.8	0.0	0.2	407%
島根県		0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	69%
岡山県		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	50%
広島県		0.8	1.2	1.0	0.7	0.2	34%
九州		0.3	1.5	0.0	0.2	0.4	190%
長崎県		0.2	—	—	—	—	—
宮崎県		—	0.2	0.0	0.0	0.2	450%
鹿児島県		0.1	1.3	0.0	0.2	0.2	137%
合計		20.1	23.8	27.3	7.5	6.3	84%

- 1 森林管理局からの報告による。
- 2 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。
- 3 四捨五入により合計と一致しない場合がある。
- 4 官行造林地を含む。