

国有林における都道府県別ナラ枯れ被害量（被害材積）の推移

(単位：千m³)

区分	年度	H22	H23	H24	H25	H26	対前年度比
北海道		—	—	—	—	—	—
東北		12.7	11.9	4.1	3.4	3.1	90%
岩手県		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158%
宮城県		0.5	0.5	0.2	1.1	1.4	118%
秋田県		0.4	0.6	0.5	0.5	1.3	236%
山形県		11.8	10.8	3.4	1.7	0.4	25%
関東		5.9	8.9	1.0	0.6	0.8	139%
福島県		0.0	0.6	0.5	0.2	0.6	355%
群馬県		0.0	0.0	0.0	0.0	—	皆減
東京都		0.0	—	—	—	—	—
新潟県		5.8	8.2	0.2	0.0	0.0	88%
静岡県		—	0.0	0.2	0.4	0.3	63%
中部		0.4	2.7	0.8	0.6	0.2	31%
富山県		0.1	0.1	0.1	0.0	—	皆減
長野県		0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	48%
岐阜県		—	1.9	0.3	0.0	0.1	347%
愛知県		0.1	0.5	0.4	0.5	0.1	19%
近畿中国		3.3	3.7	1.4	1.3	2.0	152%
石川県		—	0.0	0.0	—	—	—
福井県		—	0.2	0.0	0.0	0.0	252%
三重県		—	0.0	0.0	0.0	0.0	417%
滋賀県		0.0	0.5	0.2	0.3	0.0	14%
京都府		1.1	0.5	0.1	0.2	0.2	119%
大阪府		—	0.1	0.0	0.1	0.0	44%
兵庫県		0.4	0.3	0.0	0.1	0.3	198%
奈良県		—	—	—	0.1	0.2	169%
和歌山県		—	—	—	—	0.0	皆増
鳥取県		0.3	0.8	0.0	0.2	0.6	368%
島根県		0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	239%
岡山県		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	5%
広島県		1.2	1.0	0.7	0.2	0.3	134%
九州		1.5	0.0	0.2	0.4	0.4	98%
宮崎県		0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	88%
鹿児島県		1.3	0.0	0.2	0.2	0.2	105%
合計		23.8	27.3	7.5	6.3	6.4	103%

- 1 森林管理局からの報告による。
- 2 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。
- 3 四捨五入により合計と一致しない場合がある。
- 4 官行造林地を含む。