

都道府県別松くい虫被害量（被害材積）の推移（総数）

（単位：千m³）

年度 区分	H30	R元	R2	R3	R4	対前年度比
北海道	—	—	—	—	—	—
青森県	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	64%
岩手県	30.3	28.1	22.9	18.8	15.4	82%
宮城県	15.0	10.7	11.2	10.1	9.9	98%
秋田県	10.0	9.4	7.6	8.9	17.3	194%
山形県	25.5	24.1	20.1	25.2	25.0	99%
福島県	32.6	30.8	30.6	29.8	27.4	92%
茨城県	5.6	3.3	2.9	1.4	1.6	114%
栃木県	7.1	6.6	6.2	5.6	5.2	93%
群馬県	5.4	4.4	3.0	3.1	2.9	94%
埼玉県	—	—	0.0	0.0	0.0	100%
千葉県	0.6	0.4	1.1	0.9	1.0	101%
東京都	0.1	0.0	0.6	0.9	0.7	87%
神奈川県	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	38%
新潟県	3.5	4.4	3.2	5.3	6.6	123%
富山県	0.3	0.4	0.7	0.4	0.3	60%
石川県	3.9	5.1	7.2	6.7	5.1	76%
福井県	2.3	1.8	1.4	1.3	1.1	88%
山梨県	5.1	4.0	4.2	3.7	3.6	98%
長野県	73.9	72.0	65.7	52.7	55.6	106%
岐阜県	0.3	0.6	0.5	0.3	0.5	151%
静岡県	8.5	6.8	7.2	4.7	5.8	124%
愛知県	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	80%
三重県	2.2	0.9	0.4	0.3	0.3	104%
滋賀県	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3	145%
京都府	8.6	5.1	3.0	2.3	2.9	129%
大阪府	0.5	0.5	0.5	0.5	—	皆減
兵庫県	2.8	1.6	2.0	3.1	1.7	54%
奈良県	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	159%
和歌山県	0.5	0.8	1.4	1.1	1.1	104%
鳥取県	3.0	3.3	3.9	6.3	4.0	63%
島根県	8.1	2.9	2.9	3.6	3.8	105%
岡山県	3.0	4.2	4.1	2.5	2.5	100%
広島県	11.2	9.4	9.6	9.5	9.5	100%
山口県	17.6	14.1	14.0	12.3	12.1	99%
徳島県	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	110%
香川県	5.7	5.8	5.3	5.5	5.3	96%
愛媛県	3.5	3.0	3.0	2.9	1.7	60%
高知県	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	83%
福岡県	5.5	2.0	3.8	4.5	3.2	71%
佐賀県	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	172%
長崎県	14.0	11.3	26.5	11.5	0.9	7%
熊本県	0.5	0.4	0.5	1.3	0.7	58%
大分県	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	184%
宮崎県	1.0	1.1	1.3	1.7	2.2	131%
鹿児島県	29.9	18.7	16.0	5.1	4.3	85%
沖縄県	1.2	0.7	0.7	2.0	4.0	202%
合計	352.2	302.1	298.1	258.7	248.6	96%

注1 民有林（林野庁所管以外の国有林含む。）については、都道府県からの報告による。

2 国有林（官行造林地を含む。）については、森林管理局からの報告による。

3 都道府県ごとに小数点以下第二位を四捨五入した。

4 四捨五入により合計と一致しない場合がある。

5 被害の発生していないものを「—」、50m³未満の被害が発生しているものを「0.0」としている。