

5. 詳細調査I（森林内の放射性物質分布調査）

5.1. 目的

東京電力福島第一原子力発電所事故から約半年後の2011年8～9月にかけて、福島県内の森林における放射能汚染の実態調査を行った。その結果、放射性セシウムは樹木の葉や枝、林床の落葉層、表層土壌（0-5 cm）に存在し、材内部や事故後に伸長した葉及び5 cm以深の土壌の放射性セシウム濃度は低かった（林野庁，2011；参考文献1）。その後の放射性セシウムの分布の変化を見るため、1年後の2012年8～9月に同地点で継続調査を行った。その結果、地上部や落葉層の放射性セシウムの割合が減少し、深さ0-5 cmの表層土壌の放射性セシウムの割合が増加していた。上記の分布変化は、雨による洗脱やリターの脱落・分解によって地上部や落葉層に蓄積された放射性セシウムが表層土壌に移行したためと考えられた（林野庁，2013；参考文献2）。さらに2013年8～9月と2014年7～9月、2015年8～9月、2016年8～9月、2017年8月、2018年8～9月、2019年7～9月、2020年7～9月（一部追試試料は12月に採取）、2021年7～9月、2022年7～8月に継続調査を行った結果、各部位の放射性セシウムの濃度や分布は前年から大きくは変化していなかった（林野庁，2014；参考文献3、林野庁，2015；参考文献4、林野庁，2016；参考文献5、林野庁，2017；参考文献6、林野庁，2018；参考文献7、林野庁，2019；参考文献8、林野庁，2020；参考文献9、林野庁，2021；参考文献10、林野庁，2022；参考文献11、林野庁，2023；参考文献12）。本調査では引き続き同一調査地において調査を行い、森林内の放射性セシウムの分布状況の変化を明らかにすることを目的とする。

5.2. 調査地及び調査期間




図 5-1 調査地の位置と福島第一原子力発電所からの距離

調査は 2011 年度に福島県内に設定した 2 箇所（三ツ石、大玉）、2012 年度に設定した 1 箇所（金山）の調査地で行った（図 5.-1、写真 5.-1～5.-5）。三ツ石調査地は発電所から 26 km に位置し、調査林分は 55 年生スギ人工林、38 年生ヒノキ林、38 年生落葉広葉樹林（以後コナラ林とする）である。金山調査地は発電所から 28 km に位置する 67 年生のスギ人工林である。大玉調査地は発電所から 66 km に位置する 55 年生落葉広葉樹・アカマツ混交林（以後コナラ林とする）である。なお、大玉調査地のコナラ林はアカマツ植栽地であるが、植林後に広葉樹が侵入し、広葉樹の密度が高い林分である。表 5.-1 に各調査プロットの面積を示す。各調査プロットは、10 m 毎に打った杭で区分された 6～24 個のサブプロット（10 m×10 m）からなる。表 5.-2 には、各調査プロットを構成する樹種ごとの胸高直径と樹高の平均値、立木密度、胸高断面積及び収量比数を示す。胸高断面積の（）内には、ha 当たりの胸高断面積の総和に占める各樹種の割合を示した。スギとヒノキに関しては、樹種・地域ごとに作成された人工林林分密度管理図（参考文献 13 及び 14）から収量比数を読み取った。スギとヒノキ以外の樹種に関しては、該当する管理図が入手できなかったため空欄とした。

表 5.-1 調査地の所在地と調査期間

調査地	林相	所在地	調査期間	面積
三ツ石	スギ林	福島県双葉郡川内村下川内（磐城 森林管理署管内岡山国有林 623 林 班ほ小班）	2023 年 8 月 17 日	0.16 ha
			2023 年 8 月 21 日 ～8 月 23 日	(20 m×80 m)
	ヒノキ林	福島県双葉郡川内村下川内 (川内村村有林)	2023 年 8 月 17 日 2023 年 8 月 21 日 ～8 月 23 日	0.10 ha (20 m×50 m)
コナラ林	福島県双葉郡川内村上川内 (川内村村有林)	2023 年 8 月 17 日 2023 年 8 月 21 日 ～8 月 23 日 2023 年 9 月 5 日	0.06 ha (20 m×30 m)	
金山	スギ林	福島県双葉郡川内村上川内 (川内村村有林)	2023 年 8 月 16 日 2023 年 8 月 21 日 ～8 月 23 日	0.12 ha (40 m×30 m)
大玉	コナラ林	福島県安達郡大玉村玉井（福島森 林管理署管内前ヶ嶽外国有林 4 林 班い 4 小班）	2023 年 7 月 27 日 2023 年 7 月 31 日 ～8 月 1 日	0.24 ha (30 m×80 m)

表 5-2 調査地の樹種ごとの胸高直径と樹高の平均値、立木密度、胸高断面積及び収量比数

調査地	林相	樹種	胸高直径 (cm)	樹高 (m)	立木密度 (本/ha)	胸高断面積 (m ² /ha)	収量比数	
三ツ石	スギ林	スギ	24.1	16.5	856	44 (79%)	0.53	
		広葉樹	17.5	14.0	431	12 (21%)	—	
	ヒノキ林	ヒノキ	23.7	18.3	1330	59 (100%)	0.84	
	コナラ林	広葉樹	15.5	10.9	1667	33 (100%)	—	
金山	スギ林	スギ	34.2	20.1	725	71 (82%)	0.56	
		アカマツ・	31.2	14.4	183	15 (17%)	—	
		カラマツ						
		広葉樹	13.4	10.3	33	0.48 (0.46%)	—	
大玉	コナラ林	広葉樹	20.1	11.8	546	20 (49%)	—	
		アカマツ	23.7	13.4	454	21 (51%)	—	



写真 5.-1 Mitsunishi調査地のスギ林



写真 5.-2 Mitsunishi調査地のヒノキ林



写真 5.-3 Mitsunishi調査地のコナラ林



写真 5.-4 Kinoshita調査地のスギ林



写真 5.-5 Ohtama調査地のコナラ林

5.3. 調査方法

5.3.1. 空間線量率調査

空間線量率は、調査プロット内の 10 m 毎の格子点において、NaI (TI) シンチレーション式サーベイメータを用いて地上高 1 m と 10 cm で測定した。時定数は 10 秒とし、測定値は測定開始から 30 秒以上経過してサーベイメータの表示が安定するのを待ってから記録した。

5.3.2. 森林の現存量調査

三ツ石、金山、大玉の各調査地に設定した調査プロット（表 5.-1）において、樹木（胸高直径が 10 cm 以上の生立木）の毎木調査を行い、調査結果を既存の式に当てはめることにより、地上部の部位別現存量を推定した。一部調査地では、樹木に加え、小径木（胸高直径が 10 cm 未満の個体）を対象に調査を行い、樹木の結果とあわせて林分レベルの放射性セシウム蓄積量を推定した。現存量の推定方法は、梶本ほか（2014；参考文献 15）に従い、調査地共通の手法を用いて行った。

（1）樹木の現存量推定

樹木の現存量は、幹、枝、葉に区分し、幹はさらに樹皮、心材、辺材の 3 部位に分けて推定した（図 5.-2）。そのうち枝と葉の現存量は、既存の資料（京都議定書国別報告用に収集された調査データ等）をもとに樹種別（スギ、アカマツ、ヒノキ、落葉広葉樹）に胸高直径（DBH）を変数とした枝重、葉重（乾燥重量）それぞれのアロメトリー式（ $w = a \text{DBH}^b$ ； a 、 b は係数）を作成し推定した。なお、落葉広葉樹の推定式の作成には、既存資料（林野庁の未公開資料）のコナラ、ミズナラ、クリ他 10 数種を含む伐倒木データを使用した（梶本ほか、2014；参考文献 15）。幹の各部位の現存量は、①プロット内の各個体の幹材積を計算し、②樹皮・心材・辺材の容積比（全幹材積に占める容積の割合）を用いて生材状態における各部位の材積を求め、③各部位の容積密度（乾燥重量／生材材積）を乗じて乾燥重量に換算する手順で推定した。上記の推定方法を数式で表すと、[幹各部位の現存量] = [全幹材積] × [各部位の容積比] × [各部位の容積密度] である。なお、幹材積の推定には、DBH と樹高（H）を変数とする、樹種（スギ、アカマツ、ヒノキ、落葉広葉樹）及び直径階別に調整された材積計算式（細田ほか、2010；参考文献 16）を用いた。樹高（H）は、2011 年度に調査地や樹種別に得た一部個体（20～30 本）の測定データから導いた直径と樹高（DBH-H）の関係式から推定し、その推定値を幹材積の計算に使用した。容積比と容積密度の値は、伐倒木（3 本）から得た円板試料等から調査地及び樹種ごとに求め、計算には 2～3 年分の値の平均値を用いた（5.3.3.参照）。

（2）小径木の現存量推定

小径木の現存量は、幹・枝合計と葉の 2 つの部位に分けて推定した（図 5.-2）。小径木の毎木調査では、調査プロット内の対角線上の両隅に位置する 2 つのサブプロットを対象に、

樹種を判別して胸高直径（DBH）を測定した。各個体の幹・枝合計重と葉重は、（1）と同様、DBH を変数とするアロメトリー式をそれぞれ作成して推定した。各式の作成には、冷温帯落葉広葉樹林で得られた伐倒木の資料を用いた（広葉樹 13 種、DBH < 10 cm の個体のみ 31 本選別）（小見山ほか，2002；参考文献 17）。今年度は、三ツ石コナラ林及び大玉コナラ林で毎木調査を行った。




図 5.2 樹木・小径木の部位別現存量の推定手順

重さはすべて乾燥重量を示す。幹材積は生材状態でのものだが、容積密度(乾燥重量/生材材積)を乗じることにより乾燥状態での重量が求められる。

5.3.3. 分析用試料の採取

落葉層及び土壌の採取は、三ツ石スギ林、金山スギ林、大玉コナラ林の各調査プロット内の 12 地点、三ツ石ヒノキ林、三ツ石コナラ林では各調査地 6 地点で行った（写真 5.-6）。落葉層として、方形枠（25 cm×25 cm）を用いて枠内のすべての堆積有機物を採取した。土壌は落葉層の採取地点で採土円筒（Daiki、高さ 5 cm、内径 11 cm）を用いて採取した。表層 0-5 cm の土壌は全ての地点で、5-10、10-15、15-20 cm 深の土壌は各調査地 4 地点で採取した。

樹皮、幹材の採取では、各調査プロット内において調査木として選定した大きさの異なる樹木 6 本を対象木として選定した。幹については、地上高 1.3 m において樹幹の 4 方向から約 3 cm×3 cm の正方形に樹皮をノミで採取し（写真 5.-7）、その後 2 方向から成長錐（内径 12 mm）を用いて幹材（木材コア）を採取した（写真 5.-8）。葉、枝は、調査木の中から 4～6 本を選定し（樹皮・幹材を採取した樹木と同じ個体を 2 本以上含む）、一本梯子や高枝切はさみを用いて樹冠の上下層（スギ、ヒノキ）もしくは全層（コナラ）から採取した。幹については、上述のとおり（5.3.2.参照）、樹皮・心材・辺材ごとの現存量を推定する手順上、

伐倒木から得た試料より、各部位の容積比と容積密度を求める必要がある。今年度は、大玉調査地で大きさの異なるアカマツ3本を選定し、地際部で伐倒した後、高さ1.3 m、2.5 mと4.5 m、さらに上部は3 mごとの高さで円板を採取し、樹皮厚、心材、辺材の各直径を測定して各々の容積比を求めた。さらに、2.5 mと4.5 m高の円板からの容積密度測定用試料を採取した。伐採現場のシート上で内樹皮を含めた樹皮試料を偏りなく全周から必要量採取後、厚さ約5 cmの円板を数枚採取した。円板のうち数枚を、幹の放射性セシウム濃度測定用試料にするため、実験室に持ち帰った。円板の採取枚数は、粉碎後の辺材及び心材の量が分析必要量(2 L)に達するよう円板の心材幅と辺材幅から決定した。枝葉の放射性セシウム濃度分析用試料は、樹冠の上、中、下層(もしくは上下層)のそれぞれから枝を数本ずつサンプリングし、枝と葉に区分した後各層で混ぜてから(写真5-9)、各1 kg(生重)程度採取した。

小径木については、樹木と同様、各調査プロットの周辺で落葉広葉樹を3種類、合計9本を選定し、高枝切はさみを用いて、幹(枝込み)と葉を採取した。幹・枝合計の試料は、太さが異なる様々な部分から偏りなく採取・混合し、樹皮や心材、辺材に分けずに放射性セシウム濃度の測定に供した。



写真 5-6 落葉層と土壌の採取



写真 5-7 ノミを用いた樹皮の採取



写真 5-8 成長錐を用いた木材コアの採取



写真 5-9 葉の採取

5.3.4. 放射性セシウム濃度の測定・森林の放射性セシウム蓄積量の推定

試料の放射性セシウム濃度の測定は、次の前処理をした後に行った。伐倒せずに立木からノミで採取した樹皮はハサミで5 mm×5 mm程度に切り（写真 5.-10）、成長錐で採取した木材コアはハサミで辺材と心材に分けてから厚さ1-2 mm程度の半円に切り（写真 5.-11）、容量100 mLのU-8容器に充填した。なお、樹皮試料は詳細調査III（7.2.参照）での調査内容を兼ねるため、立木からノミで採取した樹皮は外樹皮と内樹皮に分けて放射性セシウム濃度を測定し、樹皮全体の放射性セシウム濃度は、外樹皮と内樹皮の放射性セシウム濃度をそれぞれの乾燥重量で加重平均して求めた。伐倒木から採取した樹皮は裁断機で繊維方向に5 cm程度の長さに切り、円板は鉋で辺材と心材に分けた後、カッティングミルで粉砕して容量2 Lのマリネリ容器に充填した。葉及び枝は乾燥・粉砕の処理を行った後、U-8容器または容量2 Lのマリネリ容器に充填した。落葉層は風乾後に、土壌は風乾及び混在する根や礫の除去後、一部をU-8容器に充填した。ゲルマニウム半導体検出器を用いてガンマ線スペクトロメトリ法でCs-134、Cs-137を定量し、乾燥重量当たりの放射性セシウム濃度を求めた。

今年度の放射性セシウム濃度は、2023年9月1日を基準として測定日における定量値を減衰補正した。また比較に用いた2011～2022年度の値は各年の9月1日を基準として補正したものである。Cs-134が不検出の場合は、2011年3月15日時点のCs-134濃度とCs-137濃度の比を1:1とし（Buessler et al., 2011；参考文献18）、各々の物理学的半減期に従った減衰に基づく理論的な推定式から計算されたCs-134濃度とCs-137濃度の比を用いて、各年9月1日時点のCs-137濃度からCs-134濃度を推定した。

部位別の放射性セシウム蓄積量は、単位面積当たりの落葉層、土壌、樹木の各部位の現存量に、それぞれの放射性セシウム濃度を乗じて求めた。



写真 5.-10 細分化した樹皮試料



写真 5.-11 細分化した木材コア試料

5.4. 結果及び考察

5.4.1. プロット内の空間線量率

2023年7～8月に測定した調査プロットの空間線量率は、前年度の2022年比で91～104%であった(表5-3、表5-4)。2011年の事故由来のCs-134とCs-137の濃度比が1:1だったと仮定すると、放射性セシウムに起因する空間線量率の物理的減衰による減少は、2023年度では2022年比約96%と推計される。したがって、各調査プロット内の空間線量率はほぼ物理的減衰にしたがって減少していると考えられる。なお、表5-4中で2021年度の値を2020年度ではなく2019年度の値と比較した理由は、表5-3に示した2020年度の川内村の空間線量率の測定値は、降雨等気象条件に基づく森林内の含水率の影響を受け、高かった可能性があるためである(林野庁, 2021; 参考文献10、福田, 1982; 参考文献19)。空間線量率は、各調査地ともに概ね物理的減衰に従って減少する傾向が継続しているが、2020年度のように特異な変動が見られることもあることから、今後も林分内の空間線量率の変化を注視していく必要がある(図5-3)。




図 5-3 2011～2023 年度の調査地における空間線量率（平均値）の変化

細線で標準偏差を示した。

表 5-3 2011～2023 年度の地上高 1 m と 10 cm の空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$) の平均 (標準偏差) の比較

年	三ツ石スギ林		三ツ石ヒノキ林		三ツ石コナラ林		金山スギ林		大玉コナラ林	
	1 m	10 cm	1 m	10 cm	1 m	10 cm	1 m	10 cm	1 m	10 cm
2011	3.05 (0.42)	3.41 (0.62)	-	-	-	-	-	-	0.33 (0.02)	0.38 (0.03)
2012	3.01 (0.54)	3.44 (0.86)	3.70 (0.22)	4.18 (0.45)	3.16 (0.09)	3.79 (0.22)	1.29 (0.39)	1.69 (0.54)	0.30 (0.02)	0.35 (0.02)
2013	2.47 (0.48)	2.82 (0.67)	3.09 (0.27)	3.50 (0.61)	2.46 (0.16)	2.72 (0.24)	1.05 (0.33)	1.22 (0.40)	0.23 (0.02)	0.26 (0.02)
2014	1.79 (0.36)	2.04 (0.50)	2.23 (0.21)	2.52 (0.36)	1.73 (0.10)	1.87 (0.14)	0.78 (0.26)	0.87 (0.31)	0.20 (0.01)	0.22 (0.02)
2015	1.41 (0.29)	1.68 (0.45)	1.85 (0.16)	2.29 (0.32)	1.40 (0.08)	1.59 (0.11)	0.59 (0.20)	0.68 (0.24)	0.16 (0.01)	0.18 (0.01)
2016	1.25 (0.26)	1.46 (0.38)	1.59 (0.14)	1.90 (0.21)	1.18 (0.07)	1.39 (0.16)	0.58 (0.20)	0.66 (0.22)	0.14 (0.01)	0.15 (0.01)
2017	1.06 (0.22)	1.26 (0.32)	1.42 (0.15)	1.64 (0.29)	1.07 (0.05)	1.29 (0.16)	0.50 (0.15)	0.54 (0.19)	0.12 (0.01)	0.13 (0.01)
2018	0.98 (0.21)	1.13 (0.28)	1.26 (0.13)	1.47 (0.23)	1.00 (0.09)	1.19 (0.18)	0.46 (0.15)	0.54 (0.19)	0.12 (0.01)	0.13 (0.01)
2019	0.89 (0.17)	1.03 (0.25)	1.14 (0.11)	1.35 (0.26)	0.92 (0.07)	1.14 (0.18)	0.41 (0.14)	0.49 (0.17)	0.11 (0.01)	0.12 (0.01)
2020	0.91 (0.19)	1.07 (0.26)	1.20 (0.10)	1.43 (0.28)	0.90 (0.07)	1.10 (0.16)	0.41 (0.13)	0.49 (0.16)	0.10 (0.01)	0.11 (0.01)
2021	0.75 (0.16)	0.88 (0.22)	0.97 (0.09)	1.09 (0.18)	0.76 (0.06)	0.91 (0.14)	0.33 (0.11)	0.37 (0.13)	0.09 (0.01)	0.10 (0.01)
2022	0.73 (0.16)	0.85 (0.22)	0.94 (0.09)	1.09 (0.20)	0.70 (0.06)	0.85 (0.13)	0.32 (0.11)	0.37 (0.14)	0.08 (0.01)	0.09 (0.01)
2023	0.69 (0.15)	0.81 (0.22)	0.85 (0.09)	1.00 (0.18)	0.73 (0.06)	0.87 (0.13)	0.32 (0.11)	0.36 (0.13)	0.08 (0.01)	0.10 (0.01)

空間線量率は調査プロットの 10 m×10 m の格子点において、地上高 1 m 及び 10 cm で測定し平均値 (標準偏差) で示した。

表 5.4 2012～2023 年度の地上高 1 m と 10 cm の空間線量率 (μSv/h) 平均値の前年度比

年	三ツ石スギ林		三ツ石ヒノキ林		三ツ石コナラ林		金山スギ林		大玉コナラ林	
	1 m	10 cm	1 m	10 cm	1 m	10 cm	1 m	10 cm	1 m	10 cm
2012/2011	99 %	101 %	-	-	-	-	-	-	91 %	92 %
2013/2012	82 %	82 %	84 %	84 %	78 %	72 %	81 %	72 %	76 %	74 %
2014/2013	73 %	72 %	72 %	72 %	70 %	69 %	75 %	71 %	87 %	86 %
2015/2014	79 %	83 %	83 %	91 %	81 %	85 %	76 %	78 %	83 %	83 %
2016/2015	88 %	87 %	86 %	83 %	84 %	87 %	97 %	96 %	84 %	82 %
2017/2016	85 %	86 %	90 %	87 %	91 %	93 %	87 %	82 %	89 %	88 %
2018/2017	93 %	90 %	89 %	89 %	93 %	93 %	90 %	100 %	95 %	99 %
2019/2018	90 %	91 %	90 %	92 %	92 %	96 %	90 %	90 %	93 %	93 %
2020/2019	103 %	104 %	106 %	106 %	98 %	97 %	100 %	100 %	92 %	92 %
2021/2019*	84 %	85 %	85 %	81 %	82 %	80 %	81 %	77 %	81 %	80 %
2022/2021	98 %	96 %	97 %	100 %	93 %	94 %	97 %	98 %	96 %	96 %
2023/2022	95 %	95 %	91 %	92 %	104 %	101 %	99 %	99 %	102 %	102 %

*2021 年度分の空間線量率の比は、2020 年度ではなく 2019 年度との比として算出した。

5.4.2. 森林内の資源の現存量

2023年度の三ツ石調査地のスギ林、ヒノキ林、コナラ林の地上部現存量は、それぞれ218.7 Mg/ha、256.7 Mg/ha、126.2 Mg/haであり、前年度比もしくは前々年度比で0.8~7.9%増加していた(図5-4)。金山スギ林、大玉コナラ林の地上部現存量はそれぞれ、339.6 Mg/ha、164.1 Mg/haであり、それぞれ前年度比及び前々年度比で2.1%と6.8%増加していた(図5-5)。スギ林の葉量は地上部現存量の10~11%、ヒノキ林は8%を占め、コナラ林の4~5%に比べて葉の割合が高かった。また材における心材の割合はスギ林では29~40%、ヒノキ林で35%、コナラ林で16~27%であり、コナラ林で低かった。




図 5-4 三ツ石調査地の各調査林分の地上部現存量




図 5-5 金山スギ林、大玉コナラ林の地上部現存量

5.4.3. 各部位毎、土壌等の放射性物質濃度 (Cs-134、Cs-137)

(1) 汚染度の異なるスギ林 2 調査地における部位別放射性セシウム濃度の比較

2012 年度及び 2023 年度のスギ林 2 調査地（三ツ石、金山）の放射性セシウム濃度と空間線量率の関係について見てみると、2012 年度は、いずれの部位でも調査地の空間線量率が高いほど放射性セシウム濃度が高い傾向が認められた（図 5.-6）。一方、2023 年度には、樹皮と土壌の放射性セシウム濃度については 2012 年度と同様に金山スギ林と三ツ石スギ林の空間線量率の大小関係と同じ傾向を示したが、葉、材及び落葉層の放射性セシウム濃度については両林分の空間線量率の大小関係とは逆の関係を示しており、部位によって濃度の変動傾向に違いがみられた。

このような部位による放射性セシウム濃度の変動傾向の相違は、樹木が土壌から吸収する放射性セシウムの影響の強さの違いに帰因すると考えられる。樹皮と土壌に関しては、2011 年の初期沈着の影響が強く残っていて、他の部位への放射性セシウムの移動が起こりにくいため、樹木による放射性セシウム吸収の影響は小さい。一方、葉と材は樹木の中の成長する部位であるため、土壌から吸収された放射性セシウムが移動し蓄積されてその影響を強く受ける。2 つのスギ林のうち金山スギ林は落葉層の放射性セシウム蓄積量が三ツ石スギ林よりも多く（林野庁、2023；参考文献 12）、落葉層に含まれる放射性セシウムは土壌中のものに比べて植物根が吸収しやすいと考えられている（Kruyts and Delvaux, 2002；参考文献 20）ことから、金山のスギは三ツ石のスギよりも落葉層中の放射性セシウムを多く吸収した可能性がある。落葉層の放射性セシウム濃度が葉や材と同じ傾向を示したのも、リターフォールによって葉や枝の濃度の傾向を反映した結果であると考えられる。

2023 年度のスギの葉の放射性セシウム濃度は、三ツ石、金山の順に（以後ほかの部位の値も同じ順で示す）0.36 kBq/kg、0.50 kBq/kg であり、金山のスギの濃度が高かった（図 5.-7）。原発事故から 12 年が経過し、事故後初期の変化の程度と比較すると、スギの葉の放射性セシウム濃度の変化は小さくなっており、2017 年度あるいは 2018 年度以降は、概ね下げ止まっている。2023 年度に測定したスギの枝の放射性セシウム濃度は、2 調査地でそれぞれ 0.23 kBq/kg、0.20 kBq/kg、また樹皮は 3.8 kBq/kg、1.3 kBq/kg であった。時間経過に伴う濃度変化は、枝葉に比べ、樹皮は緩やかに減少しており、三ツ石のスギでは 2014 年度以降、金山のスギでは 2018 年度以降、葉、枝、樹皮の中で樹皮の濃度が最も高くなっている。

2023 年度のスギの辺材の放射性セシウム濃度は 2 調査地でそれぞれ 0.099 kBq/kg 及び 0.14 kBq/kg、心材では 0.23 kBq/kg 及び 0.32 kBq/kg であった。スギは辺材よりも心材の放射性セシウム濃度が高くなることが知られており、三ツ石調査地のスギでは 2014 年度以降、金山調査地のスギでも 2016 年度以降その傾向が見られた。しかし、三ツ石のスギの辺材と心材はともに、2015～2016 年度頃からは放射性セシウム濃度に大きな変動が見られなくなっている。金山のスギでも、辺材と心材の放射性セシウム濃度は、2016 年度もしくは 2018 年度以降、ほとんど変化が見られていない。

心材と辺材の放射性セシウム濃度比（図 5.-8）を見ると、三ツ石のスギでは、2011 年度か

ら 2014 年度まで顕著な増加傾向が見られたが、その後 2021 年度まで 1.9 前後の値で推移していた。金山のスギでは 2012 年度から 2018 年度にかけての濃度比の増加傾向に対して、2019 年度から 2021 年度には濃度比の増加が頭打ちになっているようにも見えたが、2022 年度と 2023 年度は 2021 年度より一段と高い濃度比を示した。三ツ石のスギと同様、金山のスギでも心材/辺材の放射性セシウム濃度比の時間変化が今後緩やかに推移することも予想されるが、すでにそのような状態に至っている否かが判然としておらず、その検証のために調査を継続する必要がある。

2023 年度の落葉層の放射性セシウム濃度は三ツ石と金山のスギ林 2 調査地でそれぞれ 7.1 kBq/kg 及び 7.8 kBq/kg であり、2011 年度あるいは 2012 年度から 2023 年度にかけての 12 年間あるいは 11 年間で、いずれの調査地でも 9 割以上減少した (図 5.-7)。

2023 年度の最表層土壌 (0-5 cm) の放射性セシウム濃度は、2 調査地それぞれで 40 kBq/kg 及び 16 kBq/kg であった。三ツ石スギ林の最表層土壌では、2011 年度から 2012 年度にかけて 2 倍以上濃度が増加した。2012 年度以降、その濃度は 33~53 kBq/kg の範囲内で推移しており、長期的な増加もしくは減少の傾向は確認されなかった。一方、金山スギ林では、2012 年度から 2015 年度にかけて濃度が増加する傾向が続いていたが、2015 年度以降は三ツ石スギ林と同様に、長期的な増加もしくは減少の傾向は見られなかった。2023 年度の結果は 2 調査地とも、概ね近年の濃度変化の範囲内であった。5-10 cm の土壌の放射性セシウム濃度については、それぞれ 9.5 kBq/kg 及び 1.1 kBq/kg であった。三ツ石スギ林では、これまでの調査で最も高い値だったが、金山スギ林では、2022 年度の 2.2 kBq/kg に比べて減少した。




図 5-6 三ツ石・金山 2 調査地のスギ林における空間線量率（横軸、 $\mu\text{Sv/h}$ ）と部位別放射性セシウム濃度（縦軸、 kBq/kg ）の関係の変化

空間線量率は地上高 1m で測定した値、材の放射性セシウム濃度は辺材と心材の加重平均値、土壌は最表層（深さ 0-5 cm）の放射性セシウム濃度を用いた。




図 5.-7 三ツ石・金山 2 調査地のスギ林における部位別放射性セシウム濃度 (地上部)

地上部は優占樹種(スギ)の各部位の結果を示す。横棒と誤差棒はそれぞれ平均値と標準偏差を表す。各部位の平均値 (kBq/kg、有効数字 2 桁) を横棒の右に示し、今年度の測定結果は青文字で表記した。




図 5.-7 三ツ石・金山 2 調査地のスギ林における部位別放射性セシウム濃度 (地下部)




図 5-8 心材と辺材の放射性セシウム濃度比

縦棒は平均値、誤差棒は標準偏差を示した。

(2) 汚染度の異なるコナラ林 2 調査地 (三ツ石、大玉) における部位別放射性セシウム濃度の比較

汚染度の異なる三ツ石コナラ林及び大玉コナラ林の各部位の放射性セシウム濃度を調べた結果、2023 年度の葉はそれぞれ 4.0 kBq/kg、0.10 kBq/kg であり、いずれの調査地でも葉の放射性セシウム濃度はこれまでの中で最も低い値を示した (図 5-9)。2011 年度もしくは 2012 年度から 2023 年度にかけて、三ツ石では 5.4~10 kBq/kg、大玉では 0.10~0.58 kBq/kg の範囲で推移し、わずかに濃度が減少している可能性はあるものの、事故後初期のスギ林で認められたような顕著な濃度の減少傾向は認められない。2023 年度の枝及び樹皮の放射性セシウム濃度は、三ツ石で 1.7 kBq/kg 及び 4.1 kBq/kg、大玉では 0.047 kBq/kg 及び 0.14 kBq/kg であり、葉と同様に、これまでの調査結果の中で最も低い値であった。

辺材の放射性セシウム濃度は三ツ石と大玉でそれぞれ 0.99 kBq/kg 及び 0.025 kBq/kg、心材の放射性セシウム濃度は三ツ石と大玉でそれぞれ 0.52 kBq/kg 及び 0.014 kBq/kg であった。辺材の放射性セシウム濃度は、2 調査地ともに、2017 年度に最大値をとり、2017 年度から 2023 年度にかけて約半分減少した。心材の放射性セシウム濃度も、2 調査地ともに、2017 年度あるいは 2018 年度に最大値をとったが、以降の値の変動には明瞭な傾向は見られない。

三ツ石コナラ林、大玉コナラ林における落葉層の放射性セシウム濃度はそれぞれ 5.8 kBq/kg、0.30 kBq/kg であった。落葉層の放射性セシウム濃度は、2011 年度もしくは 2012 年

度の調査開始から 2020 年度または 2019 年度まで減少し続け、2021 年度の時点で三ツ石、大玉調査地ともに 9 割以上低下したことになる。濃度の低下は、2019 年度もしくは 2020 年度から前回調査の 2021 年度にかけて濃度の低下はほぼ見られなかったが、2023 年度の調査結果が両調査地ともこれまでで最小であったことから、今後も濃度低下が継続するのか注視する必要がある。最表層土壌 (0-5 cm) の放射性セシウム濃度はそれぞれ 23 kBq/kg 及び 2.0 kBq/kg であった。三ツ石調査地では、放射性セシウム濃度は 2012 年度の調査開始から 2023 年度に至るまで 12~32 kBq/kg の範囲内で変動している。大玉調査地でも、放射性セシウム濃度は、2011 年度から 2023 年度にかけて、1.4~5.4 kBq/kg の範囲内で変動していた。

(3) 三ツ石ヒノキ林の部位別放射性セシウム濃度

三ツ石ヒノキ林の放射性セシウム濃度を調べた結果、2023 年度の葉、枝、樹皮、辺材及び心材はそれぞれ、2.5 kBq/kg、1.3 kBq/kg、5.4 kBq/kg、0.61 kBq/kg、及び 0.41 kBq/kg であった (図 5.-10)。葉の放射性セシウム濃度は、2012 年度の調査開始以降、2014~2016 年度まで顕著に減少した後、それ以降は 2023 年度まで 3.0 kBq/kg 前後の濃度で推移している。枝の放射性セシウム濃度は、2014~2016 年度まで比較的速やかに減少した後、その後も緩やかな減少傾向が続いている。樹皮の放射性セシウム濃度は、調査を開始した 2012 年度から 2023 年度まで緩やかな減少傾向が続いている。一方、辺材及び心材の放射性セシウム濃度は、調査開始から 2014~2017 年度まで増加傾向にあったが、それ以降はほとんど変化がみられていない。

落葉層の放射性セシウム濃度は、2012 年度から 2018 年度にかけて顕著な減少を示し、それ以降は大きな変化が認められなかったものの、今年度の値は最も低い 30 kBq/kg だった。最表層土壌 (0-5 cm) の放射性セシウム濃度は 34 kBq/kg であり、調査開始から 2023 年度まで 12~43 kBq/kg 範囲内で変動している。

(4) 小径木の放射性セシウム濃度

2023 年度の小径木 (アオダモ、コハウチワ、リョウブなど) の放射性セシウム濃度は、三ツ石、大玉でそれぞれ、葉では 2.2 kBq/kg、0.084 kBq/kg、幹・枝では 0.90 kBq/kg、0.037 kBq/kg であった。三ツ石コナラ林では、樹木の枝葉と比べて、小径木の枝葉の放射性セシウム濃度の方が低かった。大玉コナラ林でも、樹木の枝葉と比べて、小径木の枝葉の放射性セシウム濃度の方が低かった。




図 5.-9 三ツ石・大玉の2調査地のコナラ林における部位別放射性セシウム濃度（地上部）
横棒と誤差棒はそれぞれ平均値と標準偏差を表す。各部位の平均値 (kBq/kg、有効数字2桁) を横棒の右に示し、今年度の測定結果は青文字で表記した。




図 5.-9 三ツ石・大玉の 2 調査地のコナラ林における部位別放射性セシウム濃度 (地下部)

三ツ石ヒノキ林




図 5.-10 三ツ石調査地のヒノキ林における部位別放射性セシウム濃度

地上部は優占樹種(ヒノキ)の各部位の結果を示す。横棒と誤差棒はそれぞれ平均値と標準偏差を表す。各部位の平均値 (kBq/kg、有効数字 2 桁) を横棒の右に示し、今年度の測定結果は青文字で表記した。

5.4.4. 森林内における放射性物質分布の変化

放射性セシウムの部位別の濃度変化は、雨による放射性セシウムの洗脱や、放射性セシウムを含む組織の脱落や分解、樹体内での転流、樹木表面及び根からの吸収などによって引き起こされると考えられる。針葉樹のスギでは、2011年度以降、葉の放射性セシウム濃度が指数関数的に減少している。2017年度あるいは2018年度以降の調査結果を見てみると、葉の放射性セシウム濃度は2調査地ともに下げ止まっている。スギは冬季にも多くの葉を付けているため、事故による直接の汚染を受けている。また、スギの葉の寿命は4~5年と言われ、汚染した葉が数年間樹体に留まる。事故後初期には雨による洗脱と落葉により汚染された葉の入れ替わりが起こり、主にこれらの2つのプロセスが葉の放射性セシウム濃度を急激に減少させたと考えられる。原発事故から12年が経過した現在では、直接汚染された葉のほとんどが落葉したため、放射性セシウム濃度に大きな変化は見られなくなり、上記2つ（洗脱、落葉）の森林内の循環過程に加え、樹体内の他の部位からの転流や、根から吸収された放射性セシウムが葉の放射性セシウム濃度に影響する段階に入っていると予想される。そのため、今後は樹体内の各部位の放射性セシウム濃度がどのように定常状態に至るのかその過程を明らかにするために、吸収・移行経路や樹種の特性を考慮しつつ引き続きモニタリングを継続し、推移を注視する必要がある。

辺材と心材の放射性セシウムの分布状況は、樹種によって異なる傾向を示した。スギは心材の方が辺材よりも高い放射性セシウム濃度を示し、辺材と心材の濃度の変動傾向は調査地によって異なっていた。三ツ石調査地のスギの辺材と心材はともに、2015~2016年度頃からは放射性セシウム濃度に大きな変動が見られなくなっている。一方、金山調査地のスギでは、2018年度頃まで心材の放射性セシウム濃度は年々増加していた。金山のスギの心材の放射性セシウム濃度は変動が大きく、2018年度以降の傾向は一定していなかった。辺材や心材の放射性セシウムの経年変化は、同樹種であっても試験地ごとに異なる傾向を示していることから、今後の変動傾向を注視する必要がある。一方、コナラは辺材の放射性セシウム濃度の方が心材よりも高い傾向で推移している。三ツ石及び大玉調査地ともに、辺材の放射性セシウム濃度は、2017年度に最大値をとり、2017年度から2023年度にかけて約半分に減少した。心材の放射性セシウム濃度も、2017年度あるいは2018年度に最大値をとったが、以降の濃度の変動に明瞭な傾向は見られていない。ヒノキもコナラと同様に、心材よりも辺材の放射性セシウム濃度が高い傾向で推移している。辺材及び心材の放射性セシウム濃度は、調査開始から2014~2017年度まで増加傾向にあったが、以降ほとんど変化はみられていない。三ツ石調査地のスギ、ヒノキ及びコナラの辺材及び心材の放射性セシウム濃度の経年変動を見てみると、ヒノキとコナラの濃度は、辺材・心材ともに類似の傾向を示した。一方、スギとヒノキとでは、辺材と心材の放射性セシウムの大小だけでなく、辺材の放射性セシウムの経年変動の傾向が互いに異なるなど、針葉樹同士であっても異なる傾向を示した。各樹種別に材の将来の放射性セシウム濃度を予測するために、樹体内の放射性セシウム濃度について、土壌から樹木への吸収や樹木から土壌への還元などの森林内の放射性

セシウムの循環に着目し、樹種や調査地の土壌の化学特性などの違いがどのように影響を及ぼすのか、今後も調査を継続していく必要がある。

林床にある落葉中の放射性セシウム濃度は、事故当初に地上部の葉に直接付着した放射性セシウムやその後に土壌から樹木の葉に吸収された放射性セシウムの脱落や雨による洗脱、また落葉自体の分解や洗脱によって変動する。落葉層の主な供給源である葉の放射性セシウム濃度は針葉樹では年々減少し、落葉広葉樹では事故年から一貫して低濃度で推移してきた。落葉層の放射性セシウム濃度は、多くの調査林分において2011年度から2012年度にかけて大きく減少し、その後も減少傾向が継続していた。三ツ石のコナラ林やヒノキ林のように2012年度あるいは2013年度から2~3年間はあまり減少しない林分もあったが、2016年度以降、再び落葉層の放射性セシウム濃度が減少する傾向が確認された。これは落葉層の堆積状態と分解速度等が調査地によって異なり、三ツ石のコナラ林やヒノキ林では当初は厚く密に堆積した落葉層の上部に沈着していた放射性セシウムが徐々に落葉層の下部に移動し、その後、落葉の分解とともに土壌へと移動したことが原因ではないかと推察された。なお、落葉層の堆積状態と分解は、水分環境の影響を受けていると考えられる。三ツ石のコナラ林やヒノキ林は、落葉層の分解が遅く、厚い落葉層が形成される乾燥した尾根部に位置し、金山のスギ林も比較的平坦な土地の緩やかな凸地形に位置する。一方、三ツ石のスギ林は落葉層の分解が早い湿潤な谷部に位置し、薄い落葉層が形成されている。生育環境の違いに伴う落葉層の量や組成の違いが、落葉層から土壌への放射性セシウムの移動に影響を及ぼしていると考えられる。また、各林分の落葉層の放射性セシウム濃度は、2018年頃から減少傾向が弱まり、変動傾向に変化が認められることから、今後の濃度変化を注視するとともに、落葉層が森林内の放射性セシウム動態に及ぼす影響についても検討を進めていく必要がある。

最表層土壌(0-5cm)の放射性セシウム濃度は、2011年度から2012年度にかけて多くの調査林分で大きく増加した。その後、大玉コナラ林では2013年度まで、金山スギ林では2015年度まで緩やかに増加した後、以降は明瞭な変化がない状態である。5cm以深の土壌の放射性セシウム濃度にはこれまで明確な変化は認められなかったが、2023年度の調査では、三ツ石スギ林と三ツ石ヒノキ林の土壌(5-10cm)で調査開始以来最も高い放射性セシウム濃度が、大玉コナラ林の土壌(5-10cm)はこれまでで2番目に高い濃度が観察された。事故後12年を経て、森林内の放射性セシウムの大部分は樹木や落葉層から土壌最表層に移行し集積しており、土壌層に到達してからの放射性セシウムの動きは緩やかだと考えられる。ただし、長期的には、土壌中での放射性セシウムの下方移動が起こる可能性があることから、今後も濃度変化を注視していく必要がある。

5.4.5. 森林内の放射性物質の蓄積量

2011年度から2012年度にかけて、森林内の放射性セシウムの分布状況は大きく変化したが、それと比較すると2013年度以降の変化は小さかった(図5-11、表5-5)。なお、小径木

の放射性セシウム蓄積割合は森林内の総セシウム蓄積量の0.3%以下であった。森林内の放射性セシウム蓄積割合について、小径木の値を除いて考察しても、その影響は非常に小さいといえる。2023年度のスギ林では樹木に森林全体（小径木、林床植生を除く）の2~4%、ヒノキ林では3%、コナラ林では1~4%の放射性セシウムが存在していた。樹木の部位別に見ると、スギ林では葉、枝、樹皮、材にそれぞれ森林全体の0.2~0.8%、0.2~0.3%、0.8~0.9%、0.7~2%、ヒノキ林では0.6%、0.5%、1%、1%、コナラ林では0.1~0.4%、0.2~0.8%、0.3~1%、0.3~2%の放射性セシウムが分布しており、地上部の各部位（葉、枝、樹皮、材）の放射性セシウム蓄積割合は前回調査時の2021年度もしくは2022年度とほとんど変わらなかった。今年度の調査において、地上部での放射性セシウム蓄積量が最も多い部位は樹皮であり（金山スギ林を除く）、初期汚染後の降水による樹皮からの放射性セシウム洗脱の影響が小さく、樹皮の剥離脱落も落葉、落枝に比べると長い時間をかけて進行していることが推察される。また、土壌中の放射性セシウムの鉛直分布について見てみると、放射性セシウムの61~86%が0-5 cmの表層に分布していた。

2023年度の落葉層の放射性セシウム蓄積割合は、三ツ石スギ林、三ツ石コナラ林、大玉コナラ林はいずれも約1%、三ツ石ヒノキ林及び金山スギ林では8%及び14%であった。また、土壌の放射性セシウム蓄積割合は三ツ石スギ林、三ツ石コナラ林、大玉コナラ林では95~99%だったのに対して、三ツ石ヒノキ林及び金山スギ林では89%及び82%と、落葉層と同様に、林分ごとの違いが依然として存在していた。これは、三ツ石スギ林、三ツ石コナラ林、大玉コナラ林と金山スギ林、三ツ石ヒノキ林の立地環境の違いが落葉層や土壌の放射性セシウムの濃度や蓄積に影響を及ぼしている可能性があり、樹木による吸収を含めてさらなる調査が必要である。

参考文献

1. 林野庁（2011）森林内の放射性物質の分布状況調査結果について（第二報）
<http://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/jisin/attach/pdf/H27izen-16.pdf>
2. 林野庁（2013）森林内の放射性物質の分布状況調査結果について
<http://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/jisin/attach/pdf/H27izen-7.pdf>
3. 林野庁（2014）森林内の放射性物質の分布状況調査結果について
<http://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/jisin/attach/pdf/H27izen-5.pdf>
4. 林野庁（2015）平成 26 年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について
<http://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/jisin/attach/pdf/H27izen-2.pdf>
5. 林野庁（2016）平成 27 年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について
<http://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/jisin/attach/pdf/H27izen-19.pdf>
6. 林野庁（2017）平成 28 年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/jyosen/H28_jittaihaaku_kekka.html
7. 林野庁（2018）平成 29 年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について

- http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/jyosen/H29_jittaihaaku.html
8. 林野庁（2019）平成 30 年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/jyosen/H30_jittaihaaku.html
 9. 林野庁（2020）令和元年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/jyosen/R1_jittaihaaku.html
 10. 林野庁（2021）令和 2 年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について
<https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/jyosen/210316.html>
 11. 林野庁（2022）令和 3 年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/jyosen/r3_surveys_on_radioactive_cesium.html
 12. 林野庁（2022）令和 4 年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/jyosen/r4_surveys_on_radioactive_cesium.html
 13. 林野庁（1999）人工林分密度管理図. 日本林業技術協会 1：表東北地方 スギ林分密度管理図
 14. 林野庁（1999）人工林分密度管理図. 日本林業技術協会 8：関東・中部 ヒノキ林分密度管理図
 15. 梶本卓也、高野勉、齊藤哲、黒田克史、藤原健、小松雅史、川崎達郎、大橋伸太、清野嘉之（2014）森林生態系における樹木・木材の放射性セシウム分布と動態の調査法. 森林総合研究所研究報告 13：113-136
 16. 細田和男、光田靖、家原敏郎（2010）現行立木幹材積表と材積式による計算値との相違及びその修正方法. 森林計画学会誌 44：23-39
 17. 小見山章、加藤正吾、二宮生夫（2002）岐阜県飛騨地方における落葉広葉樹の相対成長関係. 日林誌 84：130-134
 18. Buessler K, Aoyama M, Fukasawa M (2011) Impacts of the Fukushima Nuclear Power Plants on marine radioactivity. *Environmental Science & Technology* 45：9931-9935
 19. 福田一義（1982）モニタリングポストによる空間線量率の変動要因について. 天気 29：781-785
 20. Kruyts N, Delvaux B (2002) Soil organic horizons as a major source for radiocesium biorecycling in forest ecosystems. *J. Environ. Radioact.* 58, 175–190.




図 5.-11 調査林分における樹木及び土壌の部位別の放射性セシウム蓄積量の分布割合

左上に放射性セシウムの単位面積あたり蓄積量の合計 (±標準偏差) を示した。

(注) 2013～2014 年度、2016～2018 年度、2020～2022 年度の調査結果は省略。

表 5.5 2011～2023 年度における各調査地の放射性セシウム蓄積量の部位別分布割合
(2011 年～2017 年)

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
三ツ石スギ林	葉, 枝	32 %, 9 %	7 %, 5 %	2 %, 3 %	0.9 %, 1 %	0.9 %, 1 %	0.3 %, 0.6 %	0.4 %, 0.7 %
	樹皮	4 %	3 %	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %
	材	0.2 %	0.4 %	0.5 %	0.5 %	0.5 %	0.5 %	1 %
	落葉層	32 %	17 %	19 %	19 %	9 %	6 %	6 %
	土壌	23 %	68 %	72 %	77 %	87 %	91 %	90 %
	合計蓄積量*	1240±287	1019±358	972±297	910±269	946±544	946±376	716±265
三ツ石ヒノキ林	葉, 枝	-	12 %, 4 %	7 %, 2 %	5 %, 1 %	3 %, 1 %	0.8 %, 0.7 %	2 %, 0.5 %
	樹皮	-	3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
	材	-	0.3 %	0.4 %	0.7 %	0.8 %	1 %	1 %
	落葉層	-	44 %	49 %	37 %	50 %	50 %	35 %
	土壌	-	37 %	39 %	54 %	43 %	45 %	60 %
	合計蓄積量*	-	991±290	829±194	792±190	940±352	802±244	1002±531
三ツ石コナラ林	葉, 枝	-	-	-	-	0.4 %, 1 %	0.5 %, 1 %	0.6 %, 1 %
	樹皮	-	-	-	-	4 %	4 %	3 %
	材	-	-	-	-	0.8 %	1 %	2 %
	落葉層	-	-	-	-	37 %	20 %	20 %
	土壌	-	-	-	-	57 %	73 %	72 %
	合計蓄積量*	-	-	-	-	551±162	443±98	441±93
金山スギ林	葉, 枝	-	12 %, 16 %	8 %, 13 %	4 %, 4 %	2 %, 3 %	2 %, 2 %	3 %, 2 %
	樹皮	-	0.9 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
	材	-	0.5 %	0.5 %	0.7 %	0.8 %	2 %	1 %
	落葉層	-	49 %	52 %	46 %	31 %	35 %	16 %
	土壌	-	22 %	25 %	44 %	61 %	59 %	77 %
	合計蓄積量*	-	407±132	455±148	400±115	308±132	305±131	347±119
大玉コナラ林	葉, 枝	8 %, 7 %	0.6 %, 3 %	0.1 %, 2 %	0.1 %, 1 %	0.1 %, 0.5 %	0.1 %, 0.5 %	0.2 %, 0.5 %
	樹皮	2 %	1 %	1 %	0.6 %	0.7 %	0.6 %	0.5 %
	材	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.2 %	0.2 %	0.3 %
	落葉層	50 %	21 %	20 %	18 %	11 %	7 %	3 %
	土壌	32 %	74 %	77 %	80 %	87 %	91 %	95 %
	合計蓄積量*	91±29	103±46	95±37	72±19	73±22	58±16	76±32

*単位は kBq/m²

表 5-5 2011～2023 年度における各調査地の放射性セシウム蓄積量の部位別分布割合
(2018 年～2023 年)

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
三ツ石スギ林	葉, 枝	0.2 %, 0.6 %	0.3 %, 0.6 %	0.2 %, 0.4 %	0.3 %, 0.3 %	0.3 %, 0.5 %	0.2 %, 0.3 %
	樹皮	2 %	2 %	1 %	0.8 %	0.8 %	0.8 %
	材	0.8 %	1 %	0.8 %	0.8 %	0.6 %	0.7 %
	落葉層	3 %	5 %	2 %	2 %	1 %	1 %
	土壌	94 %	92 %	96 %	96 %	97 %	97 %
	合計蓄積量*	862±334	660±319	882±404	816±475	747±304	770±180
三ツ石ヒノキ林	葉, 枝	0.8 %, 0.8 %	0.5 %, 0.5 %	0.8 %, 0.5 %	0.9 %, 0.6 %	-	0.6 %, 0.5 %
	樹皮	3 %	2 %	2 %	2 %	-	1 %
	材	1 %	1 %	1 %	2 %	-	1 %
	落葉層	31 %	20 %	43 %	10 %	-	8 %
	土壌	64 %	76 %	53 %	85 %	-	89 %
	合計蓄積量*	626±306	866±270	818±378	690±172	-	804±318
三ツ石コナラ林	葉, 枝	0.4 %, 0.8 %	0.6 %, 1 %	0.5 %, 0.9 %	0.4 %, 0.7 %	-	0.4 %, 0.8 %
	樹皮	3 %	3 %	3 %	2 %	-	1 %
	材	2 %	2 %	2 %	2 %	-	2 %
	落葉層	10 %	13 %	3 %	5 %	-	1 %
	土壌	85 %	80 %	91 %	90 %	-	95 %
	合計蓄積量*	548±93	373±157	504±163	530±72	-	425±105
金山スギ林	葉, 枝	0.9 %, 2 %	1 %, 1 %	1 %, 1 %	1 %, 1 %	2 %, 1 %	0.8 %, 0.2 %
	樹皮	1 %	1 %	0.9 %	0.8 %	1 %	1 %
	材	2 %	2 %	1 %	3 %	3 %	2 %
	落葉層	14 %	24 %	17 %	10 %	6 %	14 %
	土壌	79 %	71 %	78 %	85 %	88 %	82 %
	合計蓄積量*	317±96	275±84	309±164	252±70	277±70	237±81
大玉コナラ林	葉, 枝	-	0.1 %, 0.3 %	-	0.1 %, 0.2 %	-	0.1 %, 0.2 %
	樹皮	-	0.4 %	-	0.3 %	-	0.3 %
	材	-	0.1 %	-	0.2 %	-	0.3 %
	落葉層	-	2 %	-	3 %	-	0.6 %
	土壌	-	97 %	-	96 %	-	99 %
	合計蓄積量*	-	55±15	-	51±20	-	50±12

*単位は kBq/m²