70年間無間伐の高齢級ヒノキ人工林における一考察

関東森林管理局森林技術センター 業務係長 須崎智広
基幹作業職員 三村勝博

1.はじめに

茨城森林管理署管内には、特別経営時代に植栽された高齢級林分が点在しています。この中でも七内国有林のヒノキ人工林は、同齢のヒノキ人工林と比較して、立木密度が高く高蓄積な状態となっていました。

この高密度・高蓄積林分の特徴を明らかにすることで、長伐期施業の森林管理に資することを目的として取り組みました。

2.調査地

茨城県常陸大宮市七内国有林内のヒノキ人工林(1911年植栽、林齢102年)以下「七内」、対照区として茨城県石岡市横道国有林内のヒノキ人工林(1910年植栽、林齢103年)以下「横道」に、調査区を設定しました。

調査は両区とも2006年に実施し、再調査は「七内」が2011年に、「横道」は2012年に行いました。

3.調査方法

調査区は「七内」が0.28ha(横43m×縦65m)、「横道」は0.25ha(横50m×縦50m)としました。

立木調査は胸高直径5cm以上の全ての樹木について、樹種名・胸高直径・樹高を測定し、立木位置図を作成しました。また、ヒノキについては枝下高を測定するとともに、伐根調査を行いました。

図-1.七内の林内

4.結果と考察(抜粋)

「横道」では1979・1997年に間伐が実施され、2012年時の調査で立木密度240本/ha、平均胸高直径44.4cm、平均樹高24.0mとなり、2006～2012年の6年間におけ

る平均胸高直径成長は0.68cm/年でした。

2006年時の胸高直径に対する胸高直径成長(図-2)と、2006年時の樹高に対する胸高直径成長(図-3)の相関は認められませんでした。これは、間伐の実施により個々の生育空間が広がったため、胸高直径が細い個体や樹高が低い個体でも、胸高直径の成長がうながされたためと考えられます。

図-2.胸高直径と胸高直径成長

図-3.樹高と胸高直径成長

「七内」では1941年(林齢31年生)の間伐を最後に、間伐が行われてきませんでした。そのため、2011年時のヒノキの立木密度は非常に高く829本/ha、平均胸高直径38.8cm、平均樹高29.7mとなり、2006～2011年の5年間における平均直径成長は0.23cm/年でした。

胸高直径階分布においては、細いものから太いものまでが分布しており、図-2と図-3に相関が認められました。これは、立木密度が高い「七内」では、胸高直径が細く、樹高の低い個体は胸高直径成長が劣る一方、胸高直径や樹高が大きい個体ほど胸高直径成長が大きくなったことによります。

造林台帳によると「七内」では、過去2回の間伐が記録されていました。伐根調査により1923年(13年生)の間伐後の立木密度は1500～1600本/haとなり、1941年(31年生)の間伐後で900～1000本/haになったと推測されました。

今後も、長伐期人工林の管理手法を確立するために、高齢級人工林の調査を継続していきます。