

松くい虫被害から北潟の松林を守るために 薬剤地上散布を実施します

マツが枯れるしくみ



散布の日時など

- ◆1回目 令和5年6月6日(火)
[予備日: 令和5年6月7日(水)／6月8日(木)]
 - ◆2回目 令和5年6月27日(火)
[予備日: 令和5年6月28日(水)／6月29日(木)]
- ※悪天候時は、それぞれ予備日に変更となります。
- ◆時間: 早朝4時～13時
 - ◆区域: 裏面の地図のとおり




使用する薬剤

使用する薬剤は、「エコワン3フロアブル(チアクロプリド水和剤)」です。水で200倍に希釀した薬剤を、動力噴霧器によって地上からマツの木の樹冠に直接散布(ha当たり散布量: 600㍑、ha当たり薬剤量: 3㍑)します。

- ・不快な臭いがなく、低濃度でマツノマダラカミキリに対して効果があります。
- ・人畜毒性は普通物で人や周辺の動物に与える影響の少ない薬剤です。
- ・周辺植物、作物に対してほとんど薬害は認められません。
- ・環境中に長期間残留することはありません。

散布区域



事故防止のためのお願い

- 1 安全のため、散布時間帯は北潟国有林への立入を禁止します。
なお、北潟国有林内の道路も散布作業中は通行止となりますので、誘導員の指示に従ってください。
- 2 散布時には、窓を閉めるようにし、洗濯物は取り込んでください。
- 3 自動車等に薬剤が付着しても、着色・退色の心配はありませんが、付着したまま乾燥すると除去しにくくなるので速やかに水洗をしてください。
- 4 散布後、1週間程度は林内の植物や落ち葉に直接触れないようにしてください。
- 5 薬剤散布は十分安全対策に配慮しておりますが、万一散布後農薬中毒と思われる頭痛やめまい等の異常を感じたときは、最寄りの医療機関で受診してください。

