

リュウキュウルリミノキ

か めい 科名 アカネ
 べつ めい 別名 タシロルリミノキ

がくめい 学名 Lasianthus fordii



く ぶ ん 区 分 もくほんるい 木本類
 ぶ ん ぶ 分布 かごしま やくしまいなん おきなわ たいわん 鹿児島 (屋久島以南)、沖縄、台湾、
 フィリピン等
 は かたち 葉 の 形 ちょうだえんけい 長楕円形
 は ふち 葉 の 縁 ぜんえん 全縁
 は さき 葉 の 先 びじょうけい 尾状形

は しゆるい たんよう 葉 の 種類 単葉
 は つきかた たいせい 葉 の 付方 対生
 は き ぶ ぜんせんけい 葉 の 基部 漸尖形
 み しゆるい えきか 実 の 種類 液果
 は な がくいろ しろいろ 花 ・ 萼 色 白色

せつ 説 山地の林内に生育し、高さ1mほどになる常緑の低木です。若い枝には短毛があります。
 めい 明 葉は対生し長楕円形で長さ7-14cmです。葉先は尾状形、表面は無毛、裏面は短毛が生えま
 す。花は葉腋から3個から5個つき、5つに裂け、わずかに短毛があります。実は球形で径
 約5mm、瑠璃色に熟し、実の先に短い突起が残ります。