

シバニツケイ

か めい
科名 クスノキ

べつ めい
別名

がくめい
学名 *Cinnamomum doederleinii*



く ぶん
区 分 もくほんるい
木本類

ぶん ぶ
分 布 かごしま あまみ おおしまいなん おきなわ
鹿児島 (奄美大島以南)、沖縄

は かたち
葉 の 形 だえんけい
楕円形

は ふち
葉 の 縁 ぜんえん
全縁

は さき
葉 の 先 どんけい
鈍形

は しゅるい たんよう
葉 の 種類 単葉

は つきかた たいせい ごせい
葉 の 付方 対生、互生

は き ふ くさびがた ぜんせんけい
葉 の 基部 くさび形、漸尖形

み しゅるい えきか
実 の 種類 液果

はな がくいろ みどりいろ めだ いろ
花・萼色 緑色や目立たない色

せいめい
説 明 かいがん がけち さんち りんない せいいく じょうりよく しょうこうぼく は なが はば
海岸の崖地から山地の林内に生育する常緑の小高木です。葉は長さ4-6 cm、幅1.5-2.5
cmです。3つの葉脈が目立ち、葉の縁は裏側へやや反り返ります。表面は無毛、裏面はは
じめ細かな毛がありますが、のちに無毛となります。花は腋生し淡黄緑色の小さな花が咲
きます。実は液果で楕円形、黒紫色に熟し長さは7 mmです。