

シロミミズ

か めい
科名 アカネ

がくめい
学名 *Tricalysia dubia*

べつ めい
別名



く ぶん
区 分 もくほんるい
木本類

ぶん ぶ
分 布 かごしま たねがしま やくしまいなん おきなわ
鹿兒島 (種子島・屋久島以南)、沖縄、
ちゅうごくちゅうなんぶ たいわん
中国中南部、台湾

は かたち
葉 の 形 ちょうだえんけい だえんけい
長楕円形、楕円形

は ぶち
葉 の 縁 ぜんえん
全縁

は さき
葉 の 先 えいけい
鋭形

は しゆるい たんよう
葉 の 種類 単葉

は つきかた たいせい
葉 の 付方 対生

は きぶ ぜんせんけい
葉 の 基部 漸尖形

み しゆるい えきか
実 の 種類 液果

はな がくいろ しろいろ
花・萼色 白色

せつ
めい
明 林内に生育し、高さ3-6mになる常緑の木で、全体に無毛です。葉は革質で互生し全縁、長楕円形から楕円形、葉先は鋭形、基部は漸尖形です。花は黄緑白色または白色の花で外面は無毛ですが、内面は全体的に柔らかい毛があります。実は液果で球形、大きさは径約5mmほどあり、赤く熟し2個から4個の種があります。