

(別表)

松くい虫被害の推移

区分	年度	52	54	57	4	6	8	9	10	11	対前年度比
		千m3	千m3	千m3	千m3	千m3	千m3	千m3	千m3	千m3	(%)
北海道											
青森県											
岩手県			0.5	0.6	9.5	10.0	10.5	12.7	13.5	21.4	159%
宮城県	0.7	1.8	5.2	18.4	21.2	29.0	28.4	26.2	26.3	26.3	100%
秋田県			0.1	8.5	12.9	26.3	18.8	18.1	20.6	20.6	114%
山形県		0.0	1.5	11.1	18.2	17.8	18.0	13.9	14.4	14.4	104%
福島県	1.1	2.8	16.7	62.6	66.6	70.4	69.2	67.0	56.8	56.8	85%
茨城県	26.5	712.5	123.3	5.8	5.8	4.0	5.3	3.5	4.6	4.6	133%
栃木県	0.5	46.9	60.3	30.1	26.2	18.6	14.7	14.5	15.8	15.8	109%
群馬県		0.4	2.0	18.5	15.3	14.1	10.8	8.7	9.8	9.8	112%
埼玉県		1.2	13.2	8.0	4.3	3.0	2.0	1.6	1.5	1.5	90%
千葉県	12.8	19.0	60.9	14.3	12.7	13.9	7.4	6.1	6.6	6.6	109%
東京都	0.3	0.7	3.6	5.1	6.2	5.9	3.7	2.5	1.7	1.7	67%
神奈川県	6.0	7.3	3.4	2.3	1.5	1.6	1.4	1.1	3.1	3.1	283%
新潟県		4.9	15.3	33.4	30.9	22.4	18.3	13.9	12.3	12.3	88%
富山県	0.5	0.5	0.6	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	80%
石川県	6.1	17.7	15.8	28.9	29.2	17.6	15.2	13.6	11.1	11.1	81%
福井県		5.2	7.0	18.3	16.5	10.2	9.8	9.3	9.3	9.3	99%
山梨県		0.6	1.3	13.1	15.7	15.0	14.7	13.2	12.5	12.5	95%
長野県			0.8	24.7	45.8	48.0	46.1	42.3	38.8	38.8	92%
岐阜県	3.9	13.4	29.3	31.8	28.1	20.3	20.0	16.4	14.7	14.7	90%
静岡県	19.6	75.2	116.2	40.5	25.2	15.2	11.5	10.3	10.4	10.4	101%
愛知県	19.3	84.1	55.4	31.3	19.9	9.5	6.4	6.4	5.2	5.2	80%
三重県	18.7	32.0	57.0	28.8	16.4	12.5	9.7	8.9	8.4	8.4	93%
滋賀県	3.4	6.8	8.5	10.4	12.2	9.6	9.0	9.1	8.4	8.4	93%
京都府	11.1	45.2	38.0	27.1	27.1	23.8	21.2	20.7	19.4	19.4	94%
大阪府	27.9	39.0	20.0	6.9	7.2	6.7	6.3	6.2	6.1	6.1	97%
兵庫県	67.5	120.7	75.3	56.7	42.6	22.0	21.9	20.2	19.9	19.9	98%
奈良県	13.1	53.3	32.0	9.3	8.2	5.5	5.0	4.5	4.6	4.6	104%
和歌山県	37.4	48.7	18.5	4.4	5.0	3.5	3.1	2.1	3.0	3.0	142%
鳥取県	5.8	120.7	68.2	26.2	27.9	38.6	36.9	38.3	33.0	33.0	86%
島根県	7.0	37.1	81.5	66.4	82.8	48.3	37.1	43.8	33.2	33.2	76%
岡山県	112.9	157.9	39.6	65.3	43.9	32.3	30.0	30.4	28.8	28.8	95%
広島県	16.2	85.8	58.3	75.0	92.7	84.5	80.0	68.8	62.5	62.5	91%
山口県	55.7	68.9	45.1	60.5	67.1	59.9	57.4	56.5	53.8	53.8	95%
徳島県	5.4	22.3	32.4	13.3	14.4	12.0	5.0	2.3	0.9	0.9	41%
香川県	19.7	111.4	66.4	36.7	39.6	35.4	29.7	29.3	22.4	22.4	76%
愛媛県	42.1	83.1	62.5	11.6	10.5	9.5	9.2	9.7	11.2	11.2	116%
高知県	11.0	9.7	10.0	8.6	2.5	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	96%
福岡県	22.3	67.2	14.6	4.8	3.9	2.2	2.2	1.4	1.2	1.2	86%
佐賀県	6.8	3.9	1.2	2.6	1.7	1.3	1.1	1.0	0.8	0.8	77%
長崎県	26.3	18.7	6.9	8.0	6.1	3.6	5.1	6.1	6.9	6.9	114%
熊本県	22.8	15.4	7.0	4.4	2.7	1.4	0.9	0.6	0.6	0.6	93%
大分県	46.7	52.3	31.4	17.9	19.9	15.2	11.8	9.8	8.2	8.2	84%
宮崎県	20.2	23.0	13.7	14.2	12.5	10.3	9.6	8.3	7.1	7.1	85%
鹿児島県	53.8	66.0	30.1	17.8	10.9	13.6	8.7	8.6	9.3	9.3	108%
沖縄県	0.8	0.5	16.9	16.5	40.1	21.4	13.5	17.0	16.0	16.0	94%
民有林	751.9	2,284.3	1,367.6	1,009.8	1,010.3	847.6	749.9	706.9	663.5	663.5	94%
国有林	57.3	148.5	98.9	116.3	106.2	72.7	60.9	52.5	52.8	52.8	101%
合計	809.2	2,432.8	1,466.5	1,126.1	1,116.5	920.3	810.8	759.5	716.3	716.3	94%
備考	昭和52年 4月「松くい虫防除特別措置法」を制定	松くい虫被害のピーク	昭和57年 3月「松くい虫被害対策特別措置法」に改正	平成4年 3月同法を改正・延長			平成9年3月 「森林病害虫等防除法」改正				

1 民有林については、都道府県からの報告による。

2 国有林(官行造林地を含む。)については、営林(支)局からの報告による。

3 都道府県ごとに単位以下第二位を四捨五入した。

4 「松くい虫」とは、松の枯死の原因となる線虫類を運ぶ松くい虫をいう。